

OVER TWEE VERSCHIEDENHEDEN
 VAN
 INLANDSCHE VLINDERS,

DOOR

P. C. T. S N E L L E N.

Om tot de juiste kennis van eene diersoort te geraken is het volstrekt noodzakelijk, dat men alle vormen kenne, waarin zij zich vertoont. Eerst dan kan men met zekerheid de kentee-kenen vaststellen, die haar van hare verwanten onderscheiden. Het is daarom, dat het afbeelden en beschrijven van belangrijke variëteiten eene zeer nuttige zaak is.

In de collectie van den heer J. Backer Junior te Oosterbeek, een welbekend en ijverig lepidopteroloog, de op bijgaande Plaat 5 bij figuur 4 en 5 afgebeelde voorwerpen ziende, die beide zeer sterk van het hoofd ras hunner soorten afwijken, kwam het mij voor dat het om bovengenoemde reden wel noodig was, ze bekend te maken. Terwijl ZEd. gaarne bereid was de vlinders daartoe te leenen, ben ik aan de welwillendheid van de redactie van het tijdschrift voor Entomologie eene plaats voor hare beschrijving verschuldigd. De heer Snellen van Vollenhoven had de goedheid de dieren af te teekenen en, schoon de juiste uitvoering der figuren eene beschrijving overtuigend maakt, wil ik met een paar woorden het verschil nader opgeven, waardoor zij zich van de typen onderscheiden, en vermelden, waar de vlinders gevangen zijn.

Fig. 5. is eene varieteit van *Anarta Myrtilli* L. ♀, zonder den gelen band op de achtervleugels, die deze soort kenmerkt. Men ziet er niet alleen geen spoor van, maar ook het buitenste gedeelte van de achtervleugels, dat anders fluweelzwart is, en daardoor het geel sterk doet afsteken, is hier donkergrauw, als het binnengedeelte.

De teekening der voorvleugels en de vorm van den vlinder, die zeer gaaf is, doen duidelijk zien, dat het geene andere soort is, maar eene varieteit van *Myrtilli*.

Ik heb nergens eene beschrijving of afbeelding eener dergelijke varieteit gezien, waaruit ik opmaak, dat zij hoogst zeldzaam voorkomt. Wel heeft de Heer Backer in de maand Mei van 1861 onder een aantal voorwerpen van *A. Myrtilli* L., die hij uit de rups verkreeg, er angetroffen, bij welke het geel op de achtervleugels beperkter was dan gewoonlijk, maar geene zoodanige varieteit als hier afgebeeld is, zelfs geene overgangen. Het dier is bij Oosterbeek op de heide gevangen; ware het soms in eene verwijderde landstreek aangetroffen, dan had welligt de een of andere Entomoloog, verlangende zijnen naam te ver-eeuwigen, het als eene nieuwe soort beschreven en aan de latere beoefenaars der Lepidopterologie misschien veel hoofdbreken op den hals gehaald!

Fig. 4. is eene varieteit van *Nemeophila Russula* L., mede zeer in het oog loopende. Dit voorwerp onderscheidt zich van het hoofd-ras door de vurige roodbruine kleur der voorvleugels, en de diepzwarte achtervleugels, hetgeen er een zeer vreemd aanzien aan geeft. Naauwkeurige vergelijking met gewone wijfjes van *Russula* doet echter zien dat wij hier slechts met een, hoewel zeer opmerkelijk, kleurverschil te doen hebben, en dat er genoegzame overgangen bestaan. Het dier is, even als de varieteit van *Myrtilli* uit de omstreken van Oosterbeek, doch de *Russula* is uit eene rups gekweekt. Beiden zijn door den heer Backer Junior aangetroffen.
